

## ～ 検査前日から検査後の準備と心得 ～

- ★ **検査前日**は、消化の良い食事を心がけ夜9時以降は絶飲・絶食してください。  
(※コップ1杯程度の水は検査前1時間前までなら可。)  
また、入れ歯安定剤の使用も止めておいてください。
- ★ **検査当日**は、引続き検査終了まで絶飲・絶食し、タバコやガム等も控えてください。  
(※糖尿病薬は薬種問わず当日服用(又は使用)した方は受診できませんが、主治医確認済の内服薬を服用の  
為の水はコップ1杯程度可。)
- ★ **検査当日**の服装は、脱着のしやすいものにし、検査の妨げとなる金属類・プラスチック類  
が付いた服装はお避けください。  
(※検査時は、破損の原因にもなる為、アクセサリ類・時計等もはずしていただきます。)
- ★ **検査中**は、回転等の体位変換や息止めの指示があります。途中で気分が悪くなったり  
不都合な事がございましたら、すぐに検診車内スタッフにお申し出ください。
- ★ **検査後**は、飲用したバリウムをスムーズに排出させる為に検診車内にて、下剤(1回分2錠)と  
検査後の重要事項を記載したリーフレット「胃X線検査を受診された方へ」を配布しますので、  
リーフレットの内容に従い、必ず服用してください。  
(※その場で追加下剤をご希望の方は、ご遠慮なく検診車内スタッフにお申し出ください。)

受診者様の安全確保、検査の精度確保のために・・・

- ◆ 基本的に、何らかの疾患をお持ちの方は、事前に主治医に胃バリウム検査受診の可・不可、  
検査当日の内服薬の服用等をご確認の上で、慎重に受診をご検討願います。
- ◆ 授乳中の方で乳児への下剤の効果・影響が不安な方は、事前に産院の医師又は助産師に  
ご相談の上で、慎重に受診をご検討願います。
- ◆ 受診者様の安全確保のため、検査直前の容態・条件によって、やむを得ず受付時または  
検診車内にて受診をお断りする場合がございます。
- ◆ 装置の使用体重(重量)制限は「135 kg」です(メーカー指定値)。故障要因・判定不能要因  
となりえます為、対象の方は医療機関での検査可能な代替え検査をご利用願います。

*ご理解・ご協力の程、宜しく願いいたします。*